

Новый метод устранения вторичных ограниченных дефектов и рубцовых деформаций боковой поверхности языка и мягких тканей дна полости рта с использованием FAMM-лоскута и ксеномембраны Permacol

К.С. Гилева, Е.А. Миронова

Отделение реконструктивной челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии и эктопротезирования ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава РФ, Москва, Россия

Контакты: Миронова Елена Александровна – e-mail: lena.arise@gmail.com

New method of elimination of secondary localized defects and cicatricial deformations in mouth floor soft tissues and tongue body with the use of FAMM-flap and Permacol xenomembrane

K.S. Gileva, E.A. Mironova

Department of Reconstructive Maxillofacial Surgery, Microsurgery and Ectoprosthesis, FSBI Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery, Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia

Contacts: Elena Mironova – e-mail: lena.arise@gmail.com

Doi: 10.25792/HN.2019.7.1.10-18

Цель. Повышение эстетических и функциональных результатов хирургического лечения пациентов с вторичными ограниченными дефектами боковой поверхности языка и мягких тканей дна полости рта с помощью методики устранения дефекта FAMM-лоскутом в сочетании с ксеномембраной Permacol.

Материал и методы. С сентября 2016 по июль 2018 г. было выполнено 5 оперативных вмешательств по устранению рубцовой деформации дна полости рта и языка с воссозданием анатомической структуры челюстно-язычного желобка (ЧЯЖ) с применением FAMM-лоскута и ксеномембраны Permacol. В качестве предоперационной подготовки выполнены МСКТ-ангиография сосудов лица, шеи с перфузией тканей щечной области и дна полости рта, волюметрическая оценка параметров ЧЯЖ до и после оперативного вмешательства, сравнение результатов, снятие альгинатных слепков исследуемой области. В послеоперационном периоде на 30-е сутки выполнено гистологическое исследование и изучение имплантированного материала Permacol с анализом процессов репарации.

Результаты. Была разработана оригинальная методика устранения вторичных ограниченных дефектов дна полости рта и боковой поверхности языка с использованием FAMM-лоскута и ксеномембраны Permacol. Для того чтобы избежать наличия тянущей ножки и ограничения открывания рта была разработана новая модификация FAMM-лоскута с поперечным направлением, с удобным углом ротации через ретромолярную область на дно полости рта. По результатам волюметрической оценки изменений параметров ЧЯЖ наблюдалось трехкратное увеличение ширины и пятикратное увеличение глубины ЧЯЖ. По данным морфологического исследования, на 30-е сутки происходило формирование специфического для данной области многослойного плоского ороговевающего эпителия, прочного коллагенового каркаса, что подтверждено результатами морфологического исследования. В результате изучения данных МСКТ-ангиографии периферических ветвей наружной сонной артерии даже у пациентов, перенесших онкопластическое лечение, включающее микрохирургическую реконструкцию, в каждом отдельном случае был визуализирован надежный источник кровоснабжения щечного лоскута.

Выводы. За счет иссечения рубцовой контрактуры и воссоздания анатомической формы ЧЯЖ достигается функционально и эстетически выгодный результат. У пациентов улучшается функция звукопроизношения, эвакуации слюны, за счет восполнения дефицита прикрепленной десны устраняется препятствие к выполнению рационального зубочелюстного протезирования. Сочетание таких факторов, как сокращение времени оперативного вмешательства, относительно небольшой донорский ущерб, надежность кровоснабжения является аргументом в пользу приоритетности выбора этого метода в ряду альтернативных реконструктивных методик.

Ключевые слова: новообразование полости рта, дефекты боковой поверхности языка и мягких тканей дна полости рта, FAMM-лоскут, ксеномембрана Permacol

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Источник финансирования. Не указан.

Для цитирования: Гилева К.С., Миронова Е.А. Новый метод устранения вторичных ограниченных дефектов и рубцовых деформаций боковой поверхности языка и мягких тканей дна полости рта с использованием FAMM-лоскута и ксеномембраны Permacol. Голова и шея = Head and neck. Russian Journal. 2019;7(1):10-18

Авторы несут ответственность за оригинальность представленных данных и возможность публикации иллюстративного материала – таблиц, рисунков, фотографий пациентов.

ABSTRACT

Purpose: to improve the aesthetic and functional results of surgical treatment of patients with secondary localized defects of the tongue body and mouth floor soft tissues using the FAMM flap technique and Permacol xenomembrane.

Material and methods. From September 2016 to July 2018, 5 surgical interventions were performed to eliminate cicatricial deformity of the mouth floor and tongue body with the mandibular-lingual groove (MLG) anatomical reconstruction using a FAMM-flap and Permacol xenomembrane. As preoperative preparation, MSCT-angiography of the face and neck vessels with the buccal area and the floor of the mouth tissues perfusion, volumetric assessment of MLG parameters before and after surgery, comparison of the results, and the alginate casts removal were performed. On the 30th day after operation a histological analysis and the examination of the implanted Permacol membrane with subsequent repair processes study were performed.

Results. An original technology for elimination of secondary localized defects on the floor of the mouth and the tongue body was developed using FAMM-flap and Permacol xenomembrane. In order to avoid a “pulling leg” defect and mouth opening restriction, a new modification of the FAMM-flap was elaborated, using transverse direction and convenient rotation angle through the retromolar region to the bottom of the oral cavity. According to the results of a volumetric assessment of changes in the MLG parameters, a threefold increase in the width and a fivefold increase in the MLG depth were observed. Morphological analysis on the 30th day showed a multi-layered squamous epithelium (specific for this area) and a strong collagen basis formation. MSCT-angiography of the external carotid artery peripheral branches demonstrated that even in patients who underwent oncoplasty, including microsurgical reconstruction, blood supply of the buccal flap was sufficient.

Conclusions: Functional and aesthetical benefits were achieved due to the cicatricial contracture elimination and the MLG anatomical reconstruction. Pronunciation and saliva evacuation were also improved and obstacles for further dental prosthesis were removed. A combination of factors such as shortened operation time, relatively small donor damage, and blood supply reliability, is an argument in favor of this method choice among the other alternative reconstructive techniques.

Keywords: tumors of the oral cavity, defects of the tongue body and mouth floor soft tissues, FAMM-flap, Permacol xenomembrane

The authors declare no conflict of interest.

Source of financing: not specified.

For citation: Gileva K.S., Mironova E.A. New method of elimination of secondary localized defects and cicatricial deformations in mouth floor soft tissues and tongue body with the use of FAMM-flap and Permacol xenomembrane. *Head and neck = Head and neck. Russian Journal.* 2019;7(1):10–18 (in Russian).

The authors are responsible for the originality of the data presented and the possibility of publishing illustrative material – tables, figures, photographs of patients.

Введение

Остаточные ограниченные дефекты в области боковой поверхности языка и дна полости рта являются частым исходом хирургического лечения по поводу новообразований языка и дна полости рта. Согласно статистике Объединенного Американского комитета по раку/Международного противоракового союза (American Joint Committee on Cancer/International Union Against Cancer), в Западных странах, а также в странах Восточно-Центральной Азии наиболее распространенным местом локализации новообразований в полости рта является язык и дно полости рта [1, 4].

Хирургическое иссечение в сочетании с лучевой терапией является наиболее оптимальной комплексной терапией. После хирургической резекции массива тканей языка и дна полости рта возникают обширные дефекты мягких тканей, требующие одномоментного реконструктивного вмешательства. «Золотым стандартом» первичной реконструкции является возмещение объема удаленных тканей реваскуляризованными мягкоткаными лоскутами (кожно-фасциальным лоскутом с предплечья, лоскутом с переднебоковой поверхности бедра) [1–4].

Целью первичной реконструкции является восстановление дефицитных тканей дна полости рта и языка. Однако сложную анатомическую структуру данной области невозможно воссоздать с помощью одноплоскостной структуры лоскута, и вос-

создание челюстно-язычного желобка (ЧЯЖ) на первом этапе реконструктивного лечения является недостижимой задачей. Хирургическая резекция опухолей полости рта (в сочетании с реконструкцией свободными мягкоткаными лоскутами) может в значительной степени менять анатомичность внутриротовых структур. У таких больных за счет недостаточной глубины ЧЯЖ, рубцовых изменений ранее пересаженного лоскута затруднена подвижность языка и невозможно выполнить съемное протезирование и установить дентальные имплантаты.

Первичная реконструкция данной области позволяет эффективно закрывать первичный мягкотканый дефект, образующийся после обширных резекций. В отдаленном послеоперационном периоде с учетом послеоперационной лучевой терапии и процессов послеоперационного рубцевания ткани лоскута сокращаются, образуется рубцовая контрактура языка и дна полости рта.

Проблемы, с которыми сталкиваются пациенты при отсутствии ЧЯЖ после первичной реконструкции – это нарушение жевания, глотания и речи, что обуславливает потребность вторичного реконструктивно-восстановительного лечения с прецизионным воссозданием исходных анатомических структур, включающих дно полости рта, боковую поверхность языка и форму ЧЯЖ.

Тянущая рубцовая деформация языка и дна полости рта в подъязычном пространстве и ретромоларной зоне делают невозможным выполнение рационального протезирования.




Рис. 1. Челюстно-язычный желобок

Черными линиями подчеркнута многоплокостная сложная форма анатомической области. Синяя линия соответствует длине, красная — ширине, зеленая — глубине желобка.

Fig. 1. Mandibular-lingual groove

Black lines underline the multi-block complex form of the anatomical region. The blue line corresponds to the length, the red line to the width, and the green line to the depth of the groove.




Рис. 2. Схема реконструкции

Fig. 2. Reconstruction scheme

Важной задачей вторичной реконструкции является создание условий для рационального протезирования за счет восполнения дефицита прикрепленной десны. На сегодняшний день в этом вопросе не существует стандартных подходов. В литературе встречаются различные методики устранения дефектов и деформаций структур полости рта, но отсутствует описание этой анатомической области как единой отдельной клинически значимой единицы со сложной трехмерной структурой, прецизионное восстановление которой является важным компонентом зубочелюстной реабилитации.

Описаны методики изолированного устранения дефектов дна полости рта и языка с помощью осевых пропеллерных лоскутов со слизистой оболочки щеки и языка [5–8] реvascularизированными свободными кожными лоскутами [9, 10], восстановление языка и дна полости рта единым моноблоком тканей с помощью различных реvascularизированных кожно-мышечных и кожно-жировых лоскутов [1–3, 19].

Наиболее распространенным методом является повторная микрохирургическая реконструкция. Но помимо прямых противопоказаний существует еще ряд таких обстоятельств, как психологическая неготовность большинства пациентов к повторной микрохирургической операции, дополнительный донорский ущерб. Эти факторы обуславливают поиск наименее травматичного и малоинвазивного метода реконструкции боковой поверхности языка и дна полости рта, устраняющего дефекты данных анатомических структур и форму ЧЯЖ.

Согласно анатомическому понятию, ЧЯЖ ограничен сверху слизистой оболочкой дна полости рта, снизу — задним отделом челюстно-подъязычной мышцы (*m. mylohyoideus*), снаружи — внутренней поверхностью тела нижней челюсти, изнутри — боковой поверхностью языка, сзади — основанием передней небной дужки (*arcus palatoglossus*), спереди граница практически отсутствует, т.к. клетчатка ЧЯЖ непосредственно связана с клетчаткой подъязычного пространства [3]. Дефект, проходящий по ЧЯЖ, представляет собой 3D-дефект, а для устранения дефекта ЧЯЖ необходим химерный лоскут, воссоздающий сложную трехмерную структуру данной области. (рис. 1).

Материал и методы

В период с сентября 2016 по июль 2018 г. было выполнено 5 оперативных вмешательств с целью устранения рубцовой деформации дна полости рта и языка с воссозданием анатомической структуры ЧЯЖ с применением FAMM-лоскута и ксеномембраны Permacol (табл. 1).

У пациентов наблюдалось снижение артикуляции, затруднение произношения и членораздельной речи, нарушение слюнооттока. Выполнение рационального протезирования было невозможным. После иссечения рубцовых тканей, производилось устранение вторичного ограниченного дефекта дна полости рта и языка с воссозданием трехмерной структуры ЧЯЖ с помощью FAMM-лоскута (слизисто-мышечного лоскута с осевым типом кровоснабжения на лицевой артерии) и ультратонкой ксеномембраны Permacol Surgical Implant (США) (рис. 2).

В контексте нашей работы понятие ЧЯЖ приобретает клиническую значимость и отличается от ранее описанного анатомического понятия ввиду того, что мы имеем дело с измененной анатомией. Для удобства понимания мы выделили новый термин «клинический челюстно-язычный желобок», который представляет собой ладьеобразное углубление от слизистой поверхности щеки до условно-боковой поверхности языка, дном является дно полости рта в ретромолярной зоне, подъязычном пространстве. Длина ЧЯЖ составляет 7–10 см, ширина — 1–1,5 см, глубина — 1–0,5 см.

В состав FAMM-лоскута (осевого слизисто-мышечного лоскута), включаются (рис. 3) [11–15]:

- слизистая оболочка полости рта и подслизистая основа, покрывающая щечную мышцу со стороны полости рта;
- часть щечной мышцы;
- сосудистая ножка, включающая лицевую артерию и комитантные вены.

Анатомия щечной мышцы отличается богатым и сложным кровоснабжением из трех основных источников [4]:

- Щечная артерия кровоснабжает заднюю порцию щечной мышцы, это ветвь верхнечелюстной артерии.
- Ветви лицевой артерии кровоснабжают переднюю часть щечной мышцы.
- Задняя верхняя альвеолярная артерия, ветвь верхнечелюстной артерии.

Слизистая оболочка щеки/Buccal mucose

Часть щечной мышцы/Part of buccal muscle

Сосудистый пучок (лицевая артерия и комитантные вены)/Vascular bundle (facial artery and comitant veins)

Дефект дна полости рта/Floor of the mouth defect




Рис. 3. Дизайн FAMM-лоскута

Fig. 3. Design FAMM-flap

Таблица 1. Клинические данные пациентов, прооперированных по оригинальной методике реконструкции боковой поверхности языка и мягких тканей дна полости рта с использованием FAMM-лоскута и ксеномембраны Permacol
Table 1. Clinical characteristics of patients who were operated with the use of FAMM-flap and Permacol xenomembrane reconstruction method.

Пациент <i>Patient</i>	Основной диагноз <i>Diagnosis</i>	В анамнезе <i>Anamnesis details</i>			Дооперационная КТ-ангиография и УЗДГ- оценка параметров кровотока <i>Preoperative CT-angiography and USDS evaluation of blood flow parameters</i>
		Заболевание <i>Disease</i>	Операции <i>Surgery</i>	ЛТ* (СОД) <i>RT (dose)</i>	
1	Рубцовая деформация дна полости рта и языка в области ЧЯЖ справа <i>Cicatricial deformation of mouth floor and tongue to the right from MLG</i>	Плоскоклеточный рак слизистой оболочки языка II стадии T2N0M0 <i>Squamous cell carcinoma of tongue Stage II – T2N0M0</i>	Гемиглосэктомия справа. Пластика языка кожно-фасциальным лоскутом с предплечья с применением микрохирургической техники <i>Hemiglossectomy. Tongue plastic surgery with skin and fascial flap from forearm using microsurgical techniques</i>	70 Гр <i>70 Gy</i>	V**=26 см/сек cm/sec d***=1,5 мм mm
2	Комбинированный дефект и деформация нижней зоны лица, включающий дно полости рта и тело нижней челюсти <i>Combined defect and lower facial zone deformation including floor of the mouth and mandible body</i>	Плоскоклеточный рак дна полости рта и языка III стадии T3N0M0 <i>Squamous cell carcinoma of tongue Stage III – T3N0M0</i>	Расширенная резекция дна полости рта, левой половины языка с сегментарной резекцией нижней челюсти во фронтальном отделе и лимфодиссекцией шейной клетчатки. Пластическое закрытие дефекта полости рта местными тканями <i>Extended resection of the floor of the mouth, the left half of the tongue with a segmental resection of the anterior mandible and cervical lymph node dissection. Plastic closure of oral defects with local tissues</i>	48 Гр <i>48 Gy</i>	V=25,3 см/сек d=1,4 мм
3	Рубцовая деформация дна полости рта и языка в области ЧЯЖ слева <i>Cicatricial deformation of floor of the mouth and tongue to the left from MLG</i>	Плоскоклеточный рак слизистой оболочки языка IV стадии <i>Squamous cell carcinoma of tongue Stage IV</i>	Гемиглосэктомия слева с селективной лимфодиссекцией с обеих сторон. Реконструкция языка лоскутом с передней поверхности бедра <i>Hemiglossectomy with selective bilateral lymphnode dissection. Tongue reconstruction with anterior femoral flap</i>	66 Гр <i>66 Gy</i>	V=22,5 мм/сек d=1, мм
4	Рубцовая деформация дна полости рта и языка <i>Cicatricial deformation of the mouth floor and tongue</i>	Химический ожог 3-й степени <i>Chemical combustion III degree</i>			V=22,2 см/сек d=1,5 мм
5	Рубцовая контрактура дна полости рта и языка <i>Cicatricial contraction of the mouth floor and tongue</i>	Термический ожог 3-й степени <i>Heat burn III degree</i>			V=23,0 см/сек d=1,6 мм

Примечание. *ЛТ – лучевая терапия V** – систолическая скорость кровотока питающей артерии d*** – диаметр питающей артерии, УЗДГ – ультразвуковая доплерография.

Note: RT – radiotherapy, V – systolic blood flow velocity of the feeding artery, d – feeding artery diameter, USDS – ultrasound Doppler sonography.



Рис. 4. Предоперационная разметка FAMM-лоскута

Fig. 4. Preoperative layout of FAMM-flap




Рис. 5. FAMM-лоскут, на держалке — перфорант от лицевой артерии

Fig. 5. FAMM-flap, perforant from the facial artery is on the holder




Рис. 6. Дефект дна полости рта устранен FAMM-лоскутом, донорская область ушита

Fig. 6. Defect of the oral cavity floor eliminated by FAMM-flap, donor area sutured

Богатое перфорантное кровоснабжение позволяет выкраивать слизисто-мышечный лоскут в области щеки длиной до 8–9 см, шириной до 2,0 см, толщиной до 0,5 см в зависимости от размеров дефекта дна полости рта [11–15].

На этапе предоперационной подготовки мы изучали периферические ветви наружной сонной артерии по данным МСКТ-ангиографии с целью определения возможности выкраивания FAMM-лоскута. Это особенно актуально у данных больных, поскольку при раке слизистой оболочки полости рта в подавляющем большинстве случаев при выполнении лимфодиссекции или микрохирургической реконструкции лицевая артерия перевязывается, в связи с чем кровоток в ней на уровне выкраивания лоскута осуществляется ретроградно либо через коллатерали.

Дефект боковой поверхности языка мы устраняли с помощью ультратонкой ксеномембраны из свиной дермы «Permacol Surgical Implant» размерами 5×5 см, толщиной 0,5 мм. Пермакол (Permacol) расшифровывается как перманентный коллаген. По структуре и свойствам представляет собой биологический имплантат из листовой свиной кожи, лишенной антигенной структуры и сшитой химически (crosslinking). Имплантат представляет собой чистый поперечно-связанный коллаген и эластин, лишенный клеточных структур, жировой ткани и пр. Данный материал не обладает антигенными свойствами и вызывает минимальную воспалительную реакцию, не отличающуюся от нормального репаративного процесса. Коллагеновые волокна являются каркасом для прорастания тканями реципиента и васкуляризации. Благодаря поперечному связыванию он устойчив к тканевым и бактериальным ферментам, вследствие чего не рассасывается со временем, не деформируется в тканях и обеспечивает постоянное укрепление мягких тканей. Минимальная реактивность Permacol не провоцирует развитие инфекционных процессов в мягких тканях и позволяет использовать его при наличии инфекции, а также не удалять его при персистенции хирургической инфекции [17–18].

На 30-е сутки после реконструкции проводилась биопсия с последующим морфологическим исследованием для оценки процессов восстановления поверхности языка на матрице мембраны Permacol. Для предоперационной волюметрической оценки параметров ЧЯЖ и послеоперационной оценки результатов проводилось снятие альгинатных слепков исследуемой области с последующим сканированием и 3D-компьютерной визуализацией. Также измеряли противоположный (здоровый) ЧЯЖ для использования его в качестве эталона реконструкции.

Для того чтобы оценить степень изменения подвижности языка, улучшение артикуляции на пред- и послеоперационном этапах был использован метод ультразвуковой визуализации и аудиозаписи. Для объективной оценки звукопроизношения были использованы артикуляторно-акустические характеристики звуков, сформулированные Л.С. Волковой, исходя из ее классификации согласных звуков на переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные [20]. Наибольшее затруднение пациенты испытывали при произнесении согласных переднеязычных звуков, таких как «с, з», что совпадает с данными, полученными при УЗ-диагностике, согласно которым в переднем отделе языка наблюдается наименьшая подвижность.

Результаты

В результате нашей работы была разработана оригинальная методика устранения вторичных ограниченных дефектов дна полости рта и боковой поверхности языка с использовани-




Рис. 7. Стереографическая модель челюстно-язычного желобка с измерениями до операции

Fig. 7. Stereographic model of MLG with measurements before surgery

ем FAMM-лоскута и ксеномембраны Permacol. Для того чтобы избежать наличия тянущей ножки, ограничивающей открывание рта, мы разработали новую модификацию FAMM-лоскута с поперечным направлением, с удобным углом ротации через ретромолярную область на дно полости рта. В ходе диссекции под волокнами щечной мышцы идентифицируется лицевая артерия, по ходу лицевой артерии по направлению к основанию ножки (0,5 см от устья Стенонова протока) визуализируется перфорант, прободаящий щечную мышцу в средней ее трети, и формируется FAMM-лоскут без пересечения лицевой артерии по протяжению на данном перфоранте (рис. 4, 5). Лоскут ротируется через ретромолярную область на дно полости рта. Образовавшийся дефект щеки закрывается послойным ушиванием. Подобный дизайн FAMM-лоскута позволяет избежать наличия тянущей ножки и ограничения открывания рта (рис. 6).

Поперечный островковый слизисто-мышечный лоскут на перфоранте от лицевой артерии (модификация FAMM-лоскута) эффективно устраняет дефект дна полости рта, участвуя в формировании нео-ЧЯЖ. По результатам волюметрической оценки изменений параметров ЧЯЖ наблюдается трехкратное увеличение ширины и пятикратное увеличение глубины ЧЯЖ (табл. 2, рис. 7–9).

Дефект в области боковой поверхности языка устраняется с помощью ксеномембраны из свиной дермы «Permacol Surgical Implant» (рис. 10). Согласно нашим наблюдениям, на 3-и сутки за счет мукокондуктивного эффекта на коллагеновой матрице наблюдались процессы краевой эпидермизации – 0,5–1 мм от края раны (рис. 11), на 30-е сутки формировался специфичный для данной области многослойный плоский ороговевающий эпителий, а также прочный коллагеновый каркас, что подтверждено результатами морфологического исследования (рис. 12).

В случае имплантации ксеномембраны Permacol процесс полной эпителизации боковой поверхности языка занял




Рис. 8. Стереографическая модель челюстно-язычного желобка с измерениями до операции

Fig. 8. Stereographic model of MLG with measurements after surgery

25–30 дней в отличие от реконструкции языка посредством кожного компонента, для которого характерен длительный процесс ослизнения лоскута (6 месяцев) [18].

В результате изучения данных МСКТ-ангиографии периферических ветвей наружной сонной артерии даже у пациентов, перенесших онкопластическое лечение, включающее микрохирургическую реконструкцию, в каждом отдельном случае был визуализирован надежный источник кровоснабжения щечного лоскута.




Рис. 9. Стереографическая модель дна полости рта с измерениями нео-ЧЯЖ (слева) после операции

Также представлены измерения недеформированного ЧЯЖ с противоположной стороны, которые были использованы в качестве референтных показателей до операции.

Fig. 9. Stereographic model of the floor of the mouth with measurements of neo-MLG (left) after surgery

There are also the measurements of non-deformed MLG from the opposite side, which were used as reference indicators before the operation.

Таблица 2. Сравнительная таблица изменений параметров ЧЯЖ до и после операции
Table 2. Comparison between MLG parameters before and after surgery

Параметры Parameters	До Before	После After
Длина, мм Length, mm	47,55–50,0	48,44–50,0
Ширина, мм Width, mm	5,3–6,37	18,02–18,42
Глубина, мм Depth, mm	0	5–8




Рис. 10. Дефект языка устранен ксеномембраной Permacol, раны ушиты

Fig. 10. Tongue defect eliminated with Permacol xenomembrane, wound sutured

В отдаленном послеоперационном периоде через 6 месяцев после стабилизации процессов рубцевания проводилась оценка звукопроизношения и артикуляции, в результате которой удалось достичь улучшения мобильности переднего и среднего отделов языка амплитудой до 10 мм (по данным УЗ-исследования), что положительно сказывалось на функции звукопроизношения и субъективно оценивалось пациентами как улучшение функции речи.

Заключение

Слизистая оболочка щеки благодаря природному избытку тканей, растяжимости, богатой васкуляризации, редким вовлечением в патологические процессы в полости рта – идеальное донорское место. Также в отличие от другого пластического материала слизистая оболочка щеки не нуждается в функциональной адаптации (ослизнение).




Рис. 12. Патоморфологическое исследование биопсийного материала, взятого на 30-е сутки после оперативного вмешательства

Fig. 12. Pathomorphological examination of biopsy material taken on the 30th day after surgery



Рис. 11. На 3-и сутки после операции

Раневая поверхность покрыта тонким слоем фибрина, наблюдается процесс краевой эпидермизации.

Fig. 11. 3rd day after operation. The wound surface is covered with a thin layer of fibrin, the process of marginal epidermization is observed.

Подобное сочетание модифицированного FAMM-лоскута на перфаранте от лицевой артерии для закрытия дефекта дна полости рта и ксеномембраны Permacol (5×5 см, 0,5 мм) для закрытия дефекта боковой поверхности языка дает возможность прецизионного воссоздания 3D-формы ЧЯЖ.

Анатомическая близость донорской зоны к реципиентной позволяет избежать дополнительного донорского ущерба, а поперечная конфигурация и дизайн лоскута с ротацией его через ретромолярную область позволяет избежать наличия тянущей ножки и ограничения открывания рта в послеоперационном периоде.

Из-за богатого перфорантного кровотока и развития коллатерального кровотока мы пришли к выводу, что слизистая оболочка щеки – надежный донорский источник, даже у пациентов, перенесших перевязку наружных сонных артерий.

Репаративные процессы в данной зоне протекают в кратчайшие сроки, даже у пациентов, получивших химиолучевую терапию.



Рис. 13. МСКТ-ангиография у пациента, перенесшего онкопластическое лечение, включающее микрохирургическую реконструкцию

Fig. 13. MSCT-angiography in a patient after oncoplasty, including micro-surgical reconstruction

The arrow indicates the supply vessel included into the flap.

За счет иссечения рубцовой контрактуры и воссоздания анатомической формы ЧЯЖ достигается функционально и эстетически выгодный результат. У пациентов улучшается функция звукопроизношения, эвакуация слюны, за счет восполнения дефицита прикрепленной десны устраняется препятствие к выполнению рационального зубочелюстного протезирования.

Сам процесс операции и послеоперационный период связаны с большим психологическим и физическим комфортом по сравнению с альтернативной микрохирургической операцией.

Сочетание таких факторов, как сокращение времени оперативного вмешательства, относительно небольшой донорский ущерб, надежность кровоснабжения являются аргументами в пользу приоритетности выбора этого метода в ряду альтернативных реконструктивных методик.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jatin Shah's Head and Neck Surgery and Oncology, 4th Edition, 2012. ISBN: 9780323248860.
2. Хубезов Д.А., Трушин С.Н., Огорельцев А.Ю., Мнихович М.В., Пучков Д.К. Опыт применения импланта PERMACOL в эксперименте и в клинике. Рос. медико-биологический вестник им. акад. И.П. Павлова. 2014;1:114–20.
3. Jatin P. Shah, Snehal G., Patel Bhuvanesh Singh. Хирургия и онкология головы и шеи: Русское издание под ред. И.В. Решетова. М., 2017. 480 с.
4. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Киев, 2002. 290 с.
5. Cordova A., Toia F., D'Arpa S., Giunta G., Moschella F. A New Mucosal Propeller Flap (Deep Lingual Artery Axial Propeller): The Renaissance of Lingual Flaps. Plastic and Reconstructive Surgery, March 2015.
6. Huang L., Guo F., Jian X.C., Ou X.R., Jiang C.H. Clinical application of submental artery perforator flap in oral and maxillofacial defect restoration after tumor resection. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2018; 53(1):3–7.
7. Naveen B.S., Mohan M.T., Joseph S.T. Contralateral Islanded Facial Artery Myomucosal Flap for the Reconstruction of Floor of the Mouth Defect. Send to Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2018;11(2):157–60.
8. İşlek A., Balci M.K., Yüksel Ö., Önal K., Arslanoğlu S., Eren E. Infrahyoid Flap, a Convenient Alternative for Reconstruction of Tongue and Floor of Mouth Defects: Case Series. Turk. Arch. Otorhinolaryngol. 2018;56(2):85–8.
9. Agrawal G., Gupta A., Chaudhary V., Qureshi F., Choraria A., Dubey H. Medial Sural Artery Perforator Flap for Head and Neck Reconstruction. Ann. Maxillofac. Surg. 2018;8(1):61–5.
10. Wolff K.-D. New aspects in free flap surgery: Mini-perforator flaps and extracorporeal flap perfusion. J. Stomatol. Oral Maxillofac. Surg. 2017;118(4):238–41.
11. Montero P.H., Patel S.G. Cancer of the Oral Cavity. Article in press. Surg. Oncol. Clin. N. Am. 2015;24(3):491–508.
12. Pribaz J., Stephens W., Crespo L., Gifford G. A new intraoral flap: Facial artery musculomucosal (FAMM) flap. Plast. Reconstr. Surg. 1992;90:421–25.
13. Sumarroca A., Rodríguez-Bauzá E., Vega C., Fernández M. Reconstruction of Oral Cavity Defects With FAMM (Facial Artery Musculomucosal) Flaps. Our. Experience Acta Otorrinolaringol. Esp. 2015;66(5):275–80.
14. Bozola A.R., Gasques J.A., Carriquiry C.E., Cardoso de Oliveira M. The buccinator musculomucosal flap: anatomic study and clinical application. Plast. Reconstr. Surg. 1989;84:250–7.
15. Joshi A., Rajendraprasad J.S., Shetty K. Reconstruction of intraoral defects using facial artery musculomucosal flap. Br. J. Plast. Surg. 2005; 58:1061–6.
16. Ayad T., Xie L. Facial artery musculomucosal flap in head and neck reconstruction: a systematic review. Head Neck. 2014.
17. Covidien. Permacol™ Surgical Implant Crosslinking Review. May 2011. White Paper.
18. Хубезов Д.А., Трушин С.Н., Огорельцев А.Ю., Мнихович М.В., Пучков Д.К. Опыт применения импланта Permacol в эксперименте и в клинике. Рос. медико-биологический вестник им. акад. И.П. Павлова. 2014;1:114–20.
19. Wei Mardini: Flaps and reconstructive surgery. 2009. 638 p.
20. Волкова Л.С., Лалаева П.И., Мاستюкова А.М. и др. Логопедия. М., 1989. 528 с.

REFERENCES

1. Jatin Shah's Head and Neck Surgery and Oncology, 4th Edition, 2012. ISBN: 9780323248860.
2. Khubezov D.A., Trushin S.N., Ogoretsev A.Yu., Mnichovich M.V., Puchkov D.K. Experience of using the PERMACOL implant in the experiment and in the clinic. Russian Medical and Biological Bulletin named after academician I.P. Pavlov. 2014; 1: 114–20.
3. Jatin P. Shah. Хирургия и онкология головы и шеи: Русское издание под ред. акцией И.В. Решетова. М., 2017. 480 с.
4. Timofeev A.A. Guide to Maxillofacial Surgery and Surgical Dentistry. Kiev, 2002. 290 p.
5. Cordova A., Toia F., D'Arpa S., Giunta G., Moschella F. A New Mucosal Propeller Flap (Deep Lingual Artery Axial Propeller): The Renaissance of Lingual Flaps. Plastic and Reconstructive Surgery, March 2015.
6. Huang L., Guo F., Jian X.C., Ou X.R., Jiang C.H. Clinical application of submental artery perforator flap in oral and maxillofacial defect restoration after tumor resection. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2018;53(1):3–7.
7. Naveen B.S., Mohan M.T., Joseph S.T. Contralateral Islanded Facial Artery Myomucosal Flap for the Reconstruction of Floor of the Mouth Defect. Send to Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2018;11(2):157–60.
8. İşlek A., Balci M.K., Yüksel Ö., Önal K., Arslanoğlu S., Eren E. Infrahyoid Flap, a Convenient Alternative for Reconstruction of Tongue and Floor of Mouth Defects: Case Series. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2018;56(2):85–8.
9. Agrawal G., Gupta A., Chaudhary V., Qureshi F., Choraria A., Dubey H. Medial Sural Artery Perforator Flap for Head and Neck Reconstruction. Ann. Maxillofac. Surg. 2018;8(1):61–5.
10. Wolff K.-D. New aspects in free flap surgery: Mini-perforator flaps and extracorporeal flap perfusion. J. Stomatol. Oral Maxillofac. Surg. 2017;118(4):238–41.
11. Montero P.H., Patel S.G. Cancer of the Oral Cavity. Article in press. Surg. Oncol. Clin. N. Am. 2015;24(3):491–508.
12. Pribaz J., Stephens W., Crespo L., Gifford G. A new intraoral flap: Facial artery musculomucosal (FAMM) flap. Plast. Reconstr. Surg. 1992;90:421–25.
13. Sumarroca A., Rodríguez-Bauzá E., Vega C., Fernández M. Reconstruction of Oral Cavity Defects With FAMM (Facial Artery Musculomucosal) Flaps. Our. Exp. Acta Otorrinolaringol Esp. 2015;66(5):275–280.
14. Bozola A.R., Gasques J.A., Carriquiry C.E., Cardoso de Oliveira M. The buccinator musculomucosal flap: anatomic study and clinical application. Plast. Reconstr. Surg. 1989;84:250–7.
15. Joshi A., Rajendraprasad J.S., Shetty K. Reconstruction of intraoral defects using facial artery musculomucosal flap. Br. J. Plast. Surg. 2005;58:1061–6.
16. Ayad T., Xie L. Facial artery musculomucosal flap in head and neck reconstruction: a systematic review. Head Neck. 2014.
17. Covidien. Permacol™ Surgical Implant Crosslinking Review. May 2011. White Paper.
18. Khubezov D.A., Trushin S.N., Ogoretsev A.Yu., Mnichovich M.V., Puchkov D.K. Experience of using the Permacol implant in the experiment and in the clinic. Russian Medical and Biological Bulletin named after academician I.P. Pavlov. 2014;1:114–20.
19. Wei Mardini: Flaps and reconstructive surgery. 2009. 638 p.

20. Volkova L.S., Lalayeva R.I., Mastuykova A.M. and others. Logopedia. M., 1989. 528 p.

Поступила 20.07.18

Принята в печать 20.11.18

Received 20.07.18

Accepted 20.11.18

Информация об авторах:

К.С. Гилева — к.м.н., пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, микрохирург, научный сотрудник отдела разработок высокотехнологичных методов реконструкции лица и шеи ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ», Москва, Россия.

Е.А. Миронова — пластический хирург, аспирант отделения реконструктивной челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии

и эктопротезирования ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России, Москва, Россия; e-mail: lena.arise@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-5362-4114>

About the authors:

K.S. Gileva — MD, PhD, plastic surgeon, maxillofacial surgeon, microsurgeon, researcher of the department of high-tech methods of face and neck reconstruction development, FSBI "SRIDMFS", Moscow, Russia.

E.A. Mironova — plastic surgeon, post-graduate student of the department of reconstructive maxillofacial surgery, microsurgery and ectoprosthetics of FSBI "SRIDMFS" of the Russian Ministry of Health, Moscow, Russia e-mail: lena.arise@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-5362-4114>

Рецензия на статью

В статье представлена проблема остаточных, ограниченных дефектов языка и дна полости рта, которые являются частым осложнением хирургического лечения рака слизистой оболочки полости рта. Известно, что первичная реконструкция данной области позволяет эффективно закрывать мягкотканый дефект, образующийся после обширных резекций. На сегодняшний день в этом вопросе не существует стандартных подходов. Предложенная в статье методика пластики для устранения дефекта челюстно-язычного желобка включает химерный лоскут, воссоздающий сложную трехмерную структуру данной области. Описаны в период с сентября 2016 по июль 2018 г. 5 клинических случаев устранения рубцовой деформации дна полости рта и языка с воссозданием анатомической структуры челюстно-язычного желобка с применением FAMM-лоскута и ксеномембраны Permacol. Данная методика позволяет сделать вывод о том, что метод оставляет минимальный донорский ущерб, в качестве пластического материала используется оптимальный донорский материал. Применение комбинированной методики позволяет воссоздать трехмерную модель анатомической зоны.

Review on the article

The article describes the problem of residual defects on the tongue and in the floor of the mouth, which often become a complication of oral cavity cancer surgical treatment. It is known that the primary reconstruction makes it possible to effectively close the soft-tissue defect formed after extensive resections in this area, however, there are no standard approaches to this issue. The technique of plastics proposed in the article helps to eliminate a defect in the maxillary lingual groove and presumes a chimeric flap use. Five clinical cases of cicatricial deformation clearing in the floor of the mouth and tongue were described; in all cases the reconstitution was performed with the use of FAMM-flap and Permacol xenomembrane. This method enables minimization of donor area damage, while the optimal donor material is used for plastics allowing the recreation of a three-dimensional model of this anatomical zone.